



Consorzio del Parco
Regionale dei Sassi
di Roccamalatina



Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna



Provincia
di Modena

ENTI CONSORZIATI
Comuni di: Guglia, Marano s/P, Castelvetro, Savignano, Vignola, Zocca.
Comunità Montana dell'Appennino MO-Est, Provincia di Modena.

VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO REGIONALE DEI SASSI DI ROCCAMALATINA



TAV. 2 - Quadro Conoscitivo
CARTA DELLA VEGETAZIONE

Piano approvato
Delibera C.P. n° 133 del 1/10/2008


CARTA in scala 1:10.000

LEGENDA

TIPOLOGIA VEGETAZIONALE

Bm	Boschi misti di roverella con ornio e acero campestre
Oc	Boschi di cerro con carpino nero, ornio e castagno
Oc	Boschi a dominanza di carpino nero, con ornio, maggiociondolo, acero opulifolito e acero campestre
Co	Boschi di castagno di origine culturale, abbandonati da tempo
Zo	Lembi di boschi mesofili del tipo Oc su cenge riferibili al tipo Zr
Ag	Boscaglie con ontano comune e strato arbustivo dominato dal nocciolo
Sp	Boscaglie e arbusteti alveali con dominanza di salici
Rr	Boschi con dominanza di robinia, con presenza di roverella, ornio e acero campestre
Ba	Vegetazione boschiva ottenuta per piantagione di conifere
Bl	Vegetazione boschiva ottenuta per piantagione di latifoglie decidue
Cf	Castagneti da frutto
Cp	Pioppeti culturali e boschi igrofili artificiali a pioppo nero
Vt	Cespuglieti a Clematis vitalba e Rubus spp.
Pr	Formazioni arbustive mesofile a Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa canina e Juniperus communis
Jc	Formazioni arbustive a dominanza di Juniperus communis
Be	Praterie a Bromus erectus e Brachypodium rupestre con Pheum bertolonii, Carex flacca, Sanguisorba minor
Sj	Praterie a Bromus erectus e Brachypodium rupestre con densi popolamenti di Spartium junceum
Vm	Vegetazione erbacea, simile al tipo Be, a basso grado di ricoprimento insediata in aree precalanchive su substrato argilloso
Zr	Cenosi erbacee confinate sulle cenge di alte pareti arenacee verticali con presenza di Galium lucidum, Festuca inops, Stachys recta, Helychrisum italicum
Pd	Praterie post-culturali a Dactylis glomerata con Agropyron repens, Bromus hordeaceus, Medicago lupulina, Achillea collina, Lolium perenne, Poa trivialis
Ar	Praterie da sfalcio semipermanenti ad Arrhenatherum elatius, Festuca pratensis, Salvia pratensis, Galium album, Lotus corniculatus, Lychnis flos-cuculi
Ad	Praterie con alberi da frutto e strato erbaceo derivante da aratura e semina di foraggiere del tipo Ar
Ph	Canneto a dominanza di Phragmites australis
Ti	Vegetazione elfotica paucispecifica a dominanza di Typha latifolia
Ca	Vegetazione elfotica con dominanza di Carex vesicaria
Es	Vegetazione erbacea pioniera su alvei ciottolosi soggetti a rapido prosciugamento caratterizzata da Epilobium dodonaei e Scrophularia canina
Se	Vegetazione infestante delle colture di cereali
Vv	Vigneti
arbo	Arboricoltura specializzata da legno
Au	Aree urbanizzate
La	Specchi lacustri privi di vegetazione macrofita
Al	Corsi d'acqua privi di vegetazione macrofita

PERIMETRAZIONE



Fonte dati: Implementazione della Carta della Vegetazione 1:10.000
Regione Emilia-Romagna e Provincia di Modena Ed. 1996